

UNIVERSIDAD PERUANA  
DEL CENTRO



UPeCEN

**“COMPORTAMIENTO SOBRE EL USO DEL CONDON  
MASCULINO EN ADOLESCENTES A NIVEL NACIONAL,  
LATINOAMERICANO Y PAISES DEL PRIMER MUNDO”**

**PRESENTADO POR LAS BACHILLERES:**

**ROMERO VILCAMECHE, Estefany Leslie**

**SARCO CRISPIN, Adriana Mercedes**

**PAR OPTAR EL TÍTULO DE**

**OBSTETRA**

**HUANCAYO – PERÚ**

**2016**

## **DEDICATORIA**

A quienes nos han heredado el tesoro más valioso que pueda dársele a una hija: amor. A quienes sin escatimar esfuerzo alguno han sacrificado gran parte de su vida para formarnos y convertirnos personas de provecho.

Con admiración y respeto a nuestros padres.

Adriana y Estefany

## **AGRADECIMIENTO**

A Dios por guiarnos y brindarnos su amor infinito para seguir en el camino correcto y llegar a culminar este periodo satisfactoriamente.

A nuestros padres por la dedicación, esfuerzo que realizaron, pero sobre todo por su amor y apoyo incondicional durante toda nuestra carrera profesional.

A Nuestras Asesoras por permitirnos ser parte del grupo de trabajo y darnos su tiempo, sus consejos, paciencia, opiniones que nos sirvieron para sentirnos satisfechas de nuestros logros y poder presentar hoy nuestro proyecto de investigación.

Adriana y Estefany

**ASESORAS DE TESIS:**

.....  
Mg. Gina León Untiveros

.....  
Mg. Karen Yuneth Muñoz Martínez

## MIEMBROS DEL JURADO

.....  
Dr. Telésforo Epifanio León Colonia

.....  
Mg. Luisa Valerio Vega

.....  
Mg. Gina Leon Untiveros

## INDICE

<b>DEDICATORIA:</b> .....	<b>3</b>
<b>AGRADECIMIENTO:</b> .....	<b>4</b>
<b>ASESORES DE TESIS:</b> .....	<b>5</b>
<b>JURADO:</b> .....	<b>6</b>
<b>ÍNDICE</b> .....	<b>7</b>
<b>RESUMEN</b> .....	<b>9</b>
<b>SUMARY</b> .....	<b>10</b>
<b>CAPÍTULO I</b> .....	<b>10</b>
<b>I. EL PROBLEMA</b> .....	<b>10</b>
1.1. Planteamiento del Problema.....	<b>12</b>
1.2. Formulación del Problema.....	<b>12</b>
1.3. Justificación .....	<b>12</b>
1.3.1. Objetivo General .....	<b>14</b>
1.3.2. Objetivos Específicos.....	<b>14</b>
<b>CAPÍTULO II</b> .....	<b>15</b>
<b>II. MARCO TEÓRICO</b> .....	<b>15</b>
2.1. Antecedentes.....	<b>15</b>
2.2. Base Teórica.....	<b>31</b>
2.3. Hipótesis.....	<b>42</b>
2.4. Variables.....	<b>42</b>
<b>CAPÍTULO III</b> .....	<b>47</b>
<b>III. DISEÑO METODOLÓGICO</b> .....	<b>47</b>
3.1. Tipo y Nivel de Investigación .....	<b>47</b>
3.2. Aspectos Éticos .....	<b>48</b>
<b>CAPÍTULO IV</b> .....	<b>48</b>
<b>IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN</b> .....	<b>48</b>
4.1. Resultados.....	<b>48</b>

4.2. Discusión .....	63
<b>CAPÍTULO V .....</b>	<b>67</b>
<b>V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>	<b>67</b>
5.1. Conclusiones .....	67
5.2. Recomendaciones .....	67
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>73</b>

## RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el comportamiento sobre el uso del condón masculino en adolescentes a nivel nacional, latinoamericano y países de primer mundo. El estudio fue de tipo observacional, comparativo, descriptivo, retrospectivo de corte transversal.

Los resultados encontrados fueron que de los adolescentes el 54% ya son madres y el 17,6% están embarazadas por primera vez, además el 25,5% usan el condón masculino. Se concluye que el 62% de los adolescentes conocen el condón masculino, sin embargo el 87.15% no utilizó condón en su primera relación sexual, y también que el 46,8% de los adolescentes tiene conocimiento de las ITS, VIH-SIDA, siendo la sífilis la infección más conocida por ellos, Por lo que podemos concluir que aunque los adolescentes tengan amplio conocimiento acerca de los condones masculinos, no tienen una real conciencia acerca del uso de este, para evitar embarazos no deseados y contraer alguna ITS, VIH-SIDA.

Palabras Claves: factores, adolescentes, embarazo.

## **SUMMARY**

The present research aimed to evaluate the behavior of adolescents in the use of male condom at national level, latin american and countries of first world. The study was observational, comparative, descriptive, cross-sectional retrospective.

The results were that 54% of female adolescents are already mothers, 17.6% of them are pregnant for the first time and 25.5% of adolescents reported having used the male condom, therefore it is concluded that 62% of the adolescents know the male condom, however 87.15% of them refers not using a condom at first intercourse, and 46.8% of adolescents are aware of STI, HIV-AIDS, syphilis being the best known infection for them, so we can conclude that although they have extensive knowledge about male condoms, have no real awareness of the use of this, to prevent unwanted pregnancies and contracting an STI, HIV-AIDS.

Key words: factors, adolescents, pregnancy.

## CAPITULO I: EL PROBLEMA

### 1.1. Planteamiento del problema

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina adolescentes al grupo etario de 12 a 17 años 11 meses y 29 días, que atraviesan el período de transición de la niñez a la edad adulta, pero no exento de riesgos.<sup>1</sup>

En la actualidad, a nivel mundial existen más de mil millones de adolescentes, y el 85% de ellos y ellas viven en países en desarrollo. En el Perú, se estima que la población adolescente de 10 a 14 años, es de 2 926 874, y de 15 a 19 años de 2 894 913 para el año 2014 según el INEI, el cual corresponde al 30.1% de la población total del país.

La adolescencia es una etapa de desarrollo físico y sexual, donde se da el inicio de sentimientos de atracción, enamoramiento y con ello el inicio de las relaciones sexuales, comportamientos que pueden conducir a actitudes de riesgos que terminan en embarazos no deseados, alguno de los cuales terminan en abortos y/o en muertes maternas, Infecciones de transmisión sexual incluidos el VIH SIDA y sus consecuencias ulteriores, sobre todo si esas relaciones son desprotegidas.

Los resultados obtenidos en el año 2013, muestran que el 5,9% de los adolescentes alguna vez embarazadas tuvieron algún embarazo que no resulto en nacido vivo, esto ocurrió principalmente en los primeros tres

meses de gestación (81,5%). Sin embargo, no se sabe si el embarazo termino espontáneamente o si la interrupción fue provocada.

El embarazo no planificado, e infecciones de transmisión sexual – VIH SIDA en la adolescencia es el resultado de la falta de información sobre el uso de los preservativos, del sexo sin protección, o del uso incorrecto de los condones. La primera relación sexual ocurre generalmente sin protección. Cerca de un quinto de adolescentes alguna vez embarazadas 19,0% usaron condón masculino en su primera relación sexual, este porcentaje es ligeramente superior en las adolescentes embarazadas por primera vez 20,8% y menor en las que ya son madres 18,3%.<sup>2</sup>

A nivel global, está plenamente demostrado que el uso correcto y consistente del condón masculino, puede prevenir el embarazo no deseado y reducir la incidencia de Infecciones de Transmisión sexual incluido el VIH - SIDA entre un 80 y 90% por estar considerado como método de doble protección, disponible en todos los establecimientos de salud. A pesar de ello aun el acceso no fácil especialmente en los adolescentes, la mayoría de ellos reporta desconocimiento sobre su uso, incomodidad y vergüenza para demandarlos. Así mismo, se han identificado diferencias de género pues son los hombres los que saben más acerca de donde obtener el condón. Las razones que explican el alto número de embarazos no deseados o no planificados en población adolescente, lo que constituye en la actualidad un problema de salud pública tanto por el número de infectados como por las consecuencias

físicas, psicológicas y sociales que generan estas infecciones en la vida de las personas que las padecen.

Por lo anteriormente señalado, partimos de que la conducta sexual de riesgo actividad sexual sin el uso del condón trae consigo problemas de salud sexual y reproductiva, por lo que merece ser estudiada. De igual forma, consideramos que tal comportamiento sexual es una expresión de la sexualidad del ser humano en la que en función del contexto sociocultural adopta matices particulares.<sup>3</sup>

Por ello, estamos motivadas a investigar este tema relevante para conocer los comportamientos sobre el uso del condón masculino en adolescentes a nivel nacional, latinoamericano y países del primer mundo, como grupo social de mayor riesgo.

## 1.2. Formulación del problema

¿Cuál es el comportamiento sobre el uso del condón masculino en adolescentes a nivel nacional, latinoamericano y países de primer mundo?

## 1.3. Justificación.

El presente trabajo toma importancia en la medida que trata de recabar información sobre el comportamiento que presentan los adolescentes ante

el uso del condón masculino a nivel nacional, latinoamericano y países de primer mundo, para indagar si existen comportamientos erróneos apoyándose en el conocimiento científico existente, el mismo que dará luces acerca de las dificultades que poseen los adolescentes para internalizar tanto el conocimiento, como el uso de este importante protector, sin embargo pese a la difusión de dichos conocimientos tanto del sector salud como por los profesionales de la educación el problema persiste y las cifras de adolescentes con ITS no registran disminuciones significativas, lo cual indica que se requieren nuevas formas de llegar a los adolescentes a fin de prevenir el comportamiento de riesgo sexual. Por tanto el trabajo que se presenta, encuentra su justificación científica en el apoyo de un amplio cuerpo de conocimientos teóricos que existe respecto a los comportamientos de riesgo.

Además esta investigación es de suma importancia, porque este grupo etario de adolescentes son quienes tienen más riesgo de ser infectados por alguna enfermedad de transmisión sexual y una de la más grave es el VIH/SIDA, y los embarazos no deseados ya que es un periodo de desarrollo marcado por la curiosidad y la experimentación sexual, desconociendo los riesgos de un comportamiento sexual no saludable y no protegido convirtiéndolo en grupo vulnerable, por todo ello que les dará una idea de cómo se encuentran en sus conocimientos acerca del uso del condón como medida preventiva a comportamientos sexuales, en el adolescente es necesario fortalecer sus conocimientos que les permita un

comportamiento sexual más seguro mediante servicios de salud que sean más amigables frente a los adolescentes y que respeten mejor sus necesidades específicas.

Los datos obtenidos proveerán de información sobre los conocimientos que poseen los adolescentes acerca este tema. Insumo que servirá como referencia para planificar actividades educativas y de asesoría, acciones pendientes a proteger a este grupo vulnerable y así contribuir a disminuir la incidencia del VIH/SIDA y embarazos no deseados en los adolescentes.

Al finalizar el presente trabajo, permitirá a los profesionales de la salud y de educación llegar de la forma más pertinente a los adolescentes a fin de prevenir dichos comportamientos de riesgo sexual, considerando la situación a nivel nacional, latinoamericano y de países de primer mundo.

#### 1.4. Objetivos

##### 1.4.1. Objetivos Generales.

Evaluar el comportamiento sobre el uso del condón masculino en adolescentes a nivel nacional, latinoamericano y países de primer mundo

#### 1.4.2. Objetivos Específicos

- Evaluar la frecuencia sobre el uso del condón masculino en adolescentes a nivel nacional, latinoamericano y países de primer mundo.
- Evaluar el conocimiento sobre el uso del condón masculino como prevención de embarazos no deseados en los adolescentes a nivel nacional, latinoamericano y países del primer mundo.
- Evaluar el conocimiento sobre el uso del condón masculino como prevención de las ITS incluido el VIH-SIDA en los adolescentes a nivel nacional, latinoamericano y países del primer mundo.
- Determinar el riesgo sexual en los adolescentes a nivel nacional, latinoamericano y países del primer mundo.

## **CAPITULO II: MARCO TEORICO**

### 2.1. Antecedentes

Mesa M, Barella J y Cobeña M, en el año 2016 en España, Identificaron comportamientos sexuales en adolescentes, con un estudio descriptivo transversal mediante una encuesta estructurada anónima. Con una muestra

de 84 alumnos el 61,9% era mujer, y el 38.1% fueron varones, El 30,1% de los varones. Ambos sexos utilizan el preservativo en el 71,4% de las ocasiones, concluyendo Se trata de una población sexualmente activa, susceptible de contagio de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados que no usa preservativo en toda relación con penetración. Es necesario fomentar actividades de educación para la salud.<sup>4</sup>

Uribe I, Aguilar J, Zacarias X y Aguilar A. en el año 2015, en México, Investigaron los factores que inciden en el uso del condón en las relaciones sexuales en una muestra de adolescentes y a partir de ello elaborar modelos estructurales que muestren las interrelaciones y los efectos directos e indirectos de dichos factores sobre la frecuencia del uso del condón, se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia, compuesta por 523 de estudiantes adolescentes inscritos de manera regular en cuatro bachilleratos públicos de la ciudad de Colima, de los cuales el 49.9% (256) son varones, respecto a la pregunta ¿usaste condón en tu primera relación sexual? El 68.8% de los hombres respondió que sí y el 31.2% respondió que no y el 2.1% no contestó. La frecuencia del uso del condón en las relaciones sexuales de los hombres, sugiere inconsistencia. Concluyendo que el uso del condón en las relaciones sexuales de adolescentes está vinculado al desarrollo de habilidades asertivas así como a percepciones positivas y aceptación del uso del condón en las relaciones sexuales.<sup>5</sup>

INEI, en el año 2015 en Perú realizó una investigación para evaluar la tendencia de la fecundidad adolescente de los últimos años y describir los diferenciales socioeconómicos para contribuir a reforzar las acciones específicas que se lleven a cabo en el país dirigidas a este grupo poblacional de mayor vulnerabilidad. Dándonos los siguientes resultados, en cuanto a la fecundidad el 54% ya son madres y el 17,6% están embarazadas por primera vez.<sup>6</sup>

Teba I, Paz M y Ramiro M. en el año 2014 en España. Evaluaron y analizaron la relación entre la satisfacción sexual, las actitudes hacia el uso del preservativo y el uso del preservativo en adolescentes, mediante un estudio descriptivo de poblaciones mediante encuestas con muestras probabilísticas, de tipo transversal. Los participantes son 1504 adolescentes españoles escolarizados de ambos sexos (48.40% varones, 51.60% mujeres), en varones, una mayor actitud positiva hacia el uso del preservativo predice una mayor probabilidad de uso del mismo en la primera relación sexual vaginal y anal. La satisfacción sexual de la pareja predice una mayor probabilidad de uso del preservativo en la primera relación sexual oral, y la satisfacción sexual sobre la sintonía de la pareja se asocia con una menor probabilidad de uso del preservativo en la primera relación sexual oral. En mujeres, una mayor satisfacción sexual personal predice una mayor probabilidad de no haber utilizado el preservativo en la primera relación sexual vaginal, la actitud positiva se relaciona con una mayor probabilidad de uso del preservativo en la primera relación sexual vaginal y anal (en varones) y es más elevada en las mujeres

en comparación con los varones. La mayor actitud positiva hacia el uso del preservativo que se observa en las mujeres en comparación con varones.<sup>7</sup>

García R, Cortés A, Vila L, Hernández M y Mesquia A. en el año 2014. Mexico. Investigaron determinar el comportamiento sexual y uso del preservativo en adolescentes y jóvenes de un área de salud, llevando a cabo un estudio descriptivo, los resultados que obtuvieron fueron: el 61% de los encuestados tenía vida sexual activa, el inicio de las relaciones ocurrió en un 44% en las edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, y en el 55%, antes de los 20. El preservativo no se usó nunca en el 30% de las encuestas y ocasionalmente en un 49%. Las principales causas argumentadas para no usarlo fueron expresar que resultaba incómodo y que no le gustaba a su pareja, y sus conclusiones fueron que es alta la frecuencia de adolescentes que inician su vida sexual activa a edades muy tempranas y así mismo la práctica del sexo protegido, aun no es sistémica y los criterios subjetivos y la falta de costumbre dificultan el uso del preservativo.<sup>8</sup>

Breña P y Pariona J. En el 2014. Perú, investigaron evaluar el nivel de conocimiento sobre el uso del condón masculino como prevención del comportamiento de riesgo sexual en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria en la Institución Educativa 9 de Julio – Concepción, con un estudio descriptivo simple transversal, obteniendo resultados según la relación entre niveles de conocimiento y uso del condón, en nuestra

investigación se tiene que los niveles predominantes son: conocimiento regular con 40% de estudiantes y el uso del condón 25.5%, le sigue el conocimiento bueno de 39.1% y el uso del condón 30%. Y sacando las siguientes conclusiones El 51.8% de los estudiantes del presente estudio se ubican en el grupo etario de 16 años, de este grupo el 40% están sexualmente activos, el 18.2% tienen un riesgo bajo porque usan condón en todas sus relaciones sexuales. La investigación mostró que 76.4% de estudiantes se encuentran sexualmente activos, del cual 68.2% usan condón y 8.2% no usan condón. La investigación mostró que el 35.5% de los estudiantes presentan un riesgo sexual medio, el 32.7% presentan un riesgo bajo y 23.6% presentan riesgo muy bajo.<sup>9</sup>

INEI, en el año 2013 en Perú, realizó una investigación para determinar la Salud Materna Infantil con una encuesta demográfica que nos dio los siguientes resultados sobre las ITS – VIH. El conocimiento sobre las ITS en adolescentes es de 46,8%entre el año 2009 y 2013. La gonorrea fue más la enfermedad más conocida por los adolescentes (33,1%), seguida de la sífilis en un 29,8%, el herpes 15,0%, el chancro (13,3%), y verrugas genitales (5,2%). Otras ITS 7,7%.<sup>10</sup>

Uribe I, Amador G, Zacarías X y Villarreal L. en el año 2012 en México. Determinaron la relación entre percepciones sobre el uso del condón y la

actividad sexual de riesgo en jóvenes universitarios y universitarios, llevando a cabo un estudio cuantitativo transversal, de tipo descriptivo y correlacional con un diseño no experimental. En el que participaron para este estudio un total de 273 estudiantes de nivel superior, de los cuales 133 estudiaban la Licenciatura en Psicología y 140 la Licenciatura en Enfermería, concluyendo respecto a la primera relación sexual -debut sexual- el 32% de los hombres y el 30% de las mujeres reportaron no haber usado condón y obtuvimos correlaciones positivas en el uso del condón en la primera relación sexual y su uso posterior.<sup>11</sup>

Valencia C y Canaval G. en el año 2012 en Colombia. Identificaron la frecuencia del uso habitual del condón y los factores que predicen, facilitan y refuerzan su uso en jóvenes universitarios, mediante un estudio analítico de corte transversal con análisis multivariado. La muestra fue de 397 estudiantes seleccionados aleatoriamente mediante un muestreo estratificado por Facultades a quienes se les aplicó una encuesta asistida por computador denominada "Reconociendo mi salud sexual", el uso habitual de condón se da para el 33 % de la población. Los factores predisponentes para su uso habitual fueron, el tener la intención y alta autoeficacia en su uso con la pareja ocasional. Entre los factores facilitadores, el uso con la pareja habitual aumenta en 19 veces la oportunidad de utilizarlo habitualmente. El ser hombre se asoció con su uso tanto en los factores predisponentes como facilitadores. Entre los reforzantes, considerar que el condón intensifica el placer al sentirse protegidos y que entre los amigos el condón sea aceptado, se asoció a su uso

habitual. En contraste, desplazar el uso del condón por otros métodos anticonceptivos disminuyó la probabilidad de usarlo habitualmente en un 60 %, el no uso habitual del condón en las relaciones pene-ano y su desplazamiento por el uso de otro método anticonceptivo, son claras evidencias de la mayor preocupación que representa para la juventud el embarazo en comparación con las ITS. Se recomendó, la formulación y ejecución de programas que apunten simultáneamente y con igual énfasis a la prevención de embarazos, del VIH y otras ITS.<sup>12</sup>

Pereira D y Ferreira E. en el año 2012 en Brasil. Identificaron el uso del preservativo entre adolescentes de sexo masculino en el inicio de su vida sexual, mediante un estudio descriptivo – exploratorio cuya recolección de datos fue hecha por medio de cuestionario contestado por 166 adolescentes del sexo masculino de una escuela pública de la ciudad de Sao Paulo-CP, Brasil, entre los estudiantes, 93,4% conocen el condón masculino y 69,8% consideran su uso importante. El inicio de la relación sexual ya ocurrió para 69,3% de los adolescentes a los 13,4 años, siendo que 40,4% usaron el condón en la primera relación sexual y 31,3% en las relaciones subsiguientes, los adolescentes de este estudio se mantienen expuestos a un embarazo no deseado o a enfermedades sexualmente transmisible (ETS), resaltando la necesidad de concientización del grupo frente a los riesgos del sexo sin protección.<sup>13</sup>

Vargas E, Morales E, Galicia L, Ortiz R y Villareal E. en el año 2012 en México. Hicieron su investigación para describir la definición de sexualidad por género en población adolescente, fue un estudio transversal analítico, en el cual obtuvieron los siguientes resultados, en relación con la definición que hacen sobre la sexualidad el 54.5% de las mujeres la definieron como la forma que tienen las personas para relacionarse entre sí, incluyendo: afecto, sentimientos, emociones contacto físico y 41.8% como relaciones sexuales (coito). En el grupo de los varones 40.8% la definen como relaciones sexuales (coito) y 39.2% como diferencia de género ser hombre o mujer por características fenotípicas. Los adolescentes ubican que los problemas que se pueden presentar al iniciar su vida sexual activa son el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones de transmisión sexual, siendo principalmente las mujeres quienes viven las consecuencias. Sus conclusiones fueron que la definición de mujeres y varones adolescentes se diferencia, ya que existen elementos socioculturales sobre el cuerpo y la sexualidad establecen un tipo diferente para cada género, por lo que la integración de cuidado y responsabilidad sobre el cuerpo y la sexualidad se toman puntos distantes con consecuencias diferentes para cada uno.<sup>14</sup>

Navarro M y López A, en el año 2012, investigaron el nivel de conocimiento y actitudes sexuales en adolescentes de la urbanización las palmeras – Tarapoto, utilizando un estudio descriptivo simple, no experimental, de corte transversal, con recolección prospectiva de datos, obteniendo los siguientes resultados, un 54.4% de adolescentes ha iniciado relaciones sexuales; el

54.7% inició sus relaciones sexuales entre las edades de 12 – 15 años; lo que demuestra un porcentaje aceptable del nivel de escolaridad, además se observa que tienen un aceptable nivel de conocimientos: sobre Anatomía y Fisiología Sexual el 43.0% nivel de conocimiento alto y el 41.8% nivel de conocimiento medio; sobre salud sexual y reproductiva el 57% nivel de conocimiento alto; en prevención de ITS y VIH-SIDA, el 50.6% nivel de conocimiento alto; y sobre los métodos anticonceptivos, el 56% tiene nivel de conocimientos alto, en conclusión los adolescentes tienen un buen nivel de conocimiento sobre sexualidad, tal como se encontró en el presente estudio que el 70.9% con un nivel de conocimiento alto y 22.8% con nivel de conocimiento medio, además estos tienen actitudes favorables frente a las dimensiones: Responsabilidad y prevención del riesgo sexual obtuvo un 83.5%; en la dimensión libertad para tomar decisiones el 58.2%; en la dimensión de autonomía el 81.0%; en la dimensión sexualidad y amor obtuvo el 74.7%. 15

Díaz G. En el 2012. Perú. Investigó los determinantes de comportamientos sexuales en un grupo de hombres de alto riesgo que tienen sexo con hombres, utilizando muestreo aplicativo no probabilístico. Obteniendo como resultados que la mayoría de la muestra estudiada no usa condón en sexo oral insertivo/receptivo y el 92,1% de la muestra usó alcohol durante las relaciones sexuales, además se aprecia que el 6,3% de la muestra de estudio resultaron positivos a la prueba de VIH luego del año de seguimiento, mientras que el 93,7% se mantuvieron VIH (-). Y sacando estas conclusiones los

comportamientos sexuales de riesgo hallados fueron: El sexo anal receptivo sin condón, el haber tenido más de seis parejas sexuales hombres en los últimos tres meses, el consumo de alcohol durante el sexo, el desconocer el seroestatus de la pareja sexual. Además que los participantes presentaron una actitud favorable (61,3%) en relación al uso del condón; se consideran capaces de evadir situaciones sexuales de riesgo (73,4%). <sup>16</sup>

UNICEF, en el año 2012 en Argentina, identificaron y analizaron los conocimientos, actitudes y prácticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva (SSR), VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS); así como el uso de los servicios de salud, y los niveles de acceso y modalidades de uso de las tecnologías de información y comunicación, con resultados que entre los adolescentes argentinos, con un método cuantitativo, descriptiva, temporal, el total de los adolescentes que participaron de este estudio (97%) mencionó conocer al menos un método para evitar embarazos, y más de un tercio (37%) pudo indicar al menos dos. Los MAC más mencionados fueron el preservativo (96%)<sup>4</sup>, seguido de las pastillas anticonceptivas (65%), y en menor medida el DIU (22%), concluyendo que los adolescentes acerca de los métodos anticonceptivos, especialmente del preservativo. Este también es el método más utilizado por los participantes. Asimismo, entre aquellos adolescentes que se iniciaron sexualmente es destacable el amplio porcentaje que señala utilizar los MAC siempre (69%) o la mayoría de las veces (20%) con el fin de evitar embarazos. Incluso este número supera levemente al uso consistente de MAC con el fin de evitar ITS (68% y 16% respectivamente).<sup>17</sup>

García N, Méndez G, Gutiérrez A, Pérez J y Aranda R. en el año 2011 en Cuba. Investigaron describir las actitudes hacia el uso del condón masculino para la prevención del VIH/ sida en estudiantes de Medicina, fue un estudio de diseño descriptivo con un corte transversal, en cual de un total de 225 estudiantes respondieron haber usado condón alguna vez en su vida, las vías más frecuentes por la cuales los estudiantes obtuvieron la información acerca del uso del condón para la prevención del VIH/ sida, reconociendo a los medios de difusión masiva en un 71,3% y materiales escritos 64%, además del conocimiento del lugar donde se guarda el condón y su conservación, el 71%, desconocen este importante elemento y solo el 29% dice conocerlo. En conclusión los estudiantes encuestados tienen prácticas y conductas sexuales de riesgo de infección por el VIH/sida, si se tiene en cuenta el comienzo de edades tempranas de las relaciones sexuales y el no uso de condón en gran parte de los casos, además que los medios de comunicación tienen un papel muy importante sobre el fomento de la sensibilidad y difusión de los conocimientos para la prevención del VIH/SIDA.<sup>18</sup>

Caballero M, Camargo F y Zurany B. en el 2011. Colombia investigaron determinar la prevalencia de prácticas inadecuadas de uso del condón y sus factores asociados en estudiantes universitarios se realizó un estudio de corte transversal, obteniendo los siguientes resultados, del total de 2328 estudiantes el 23% recibió información del VIH por parte de la universidad, 39% utiliza siempre el condón durante las prácticas sexuales esto disminuye el riesgo de

que haya técnica inadecuada del uso del condón y 40% proporciona siempre y/o el condón en la relación sexual y sus conclusiones fueron que dos terceras partes de la población de estudiantes que participaron no saben utilizar correctamente el condón y por lo tanto no están previniendo la propagación del VIH y otras ITS, así como evitar el embarazo no planificado, por lo anterior nos lleva a formular estrategias que permitan mejorar y evaluar la habilidad del uso correcto del condón.<sup>19</sup>

Paz M, Herencia A y Uribe A. en el año 2009 en España, investigaron determinar las Versiones fuerte y débil del modelo de información, motivación – habilidades conductuales en la predicción del uso del preservativo, fue un estudio ex-post-facto retrospectivo factorial, obteniendo estos resultados, respecto a la variable uso del preservativo, con sus parejas estables el 31.2% frente al 24.1% con sus parejas ocasionales, indicaron que nunca utilizaron el preservativo; estos porcentajes fueron de 29.8% y 23.3% para la categoría a veces utilizo el preservativo, y de 39% y 54.6% para el uso consistente del preservativo, indicando que se hace un mayor uso de él con las parejas ocasionales. Las personas que tienen una actitud más favorable al sexo y unos rasgos típicamente masculinos son las que tienen mejores conocimientos sobre el VIH/sida, y a la inversa, además obteniendo estas conclusiones que indican que las variables referidas a los componentes de información y motivación tienen un efecto directo sobre el uso del preservativo y este no se ve mediado por la autoeficacia.<sup>20</sup>

Jeronimo C, Alvarez J, Carbonel W y Neira J. en el año 2009 en Peru, Evaluaron las características del conocimiento, actitud y práctica sobre sexualidad y métodos anticonceptivos en estudiantes del cuarto y quinto año de educación secundaria del cercado de Ica. Con un estudio Descriptivo de Corte transversal. De 247 estudiantes, 50,5% fueron de sexo femenino y 49,5% fueron de sexo masculino, El 47,6% de los estudiantes señaló que la persona con quien habla de sexo eran los padres. 34,6% señaló que la fuente de información primaria sobre sexualidad era la madre y el profesor 28,6%. El 72,2% perciben que su conocimiento sobre sexualidad es regular y 90,0% que conoce los métodos anticonceptivos. El 93,5% está predispuesto a usarlos en una relación sexual, siendo el condón el método que más se usaría (62,4%). El 61% de los estudiantes manifestaron tener enamorado(a); 27% refirieron haber tenido ya relaciones coitales (132). De ellos un 76,5% usan condón en sus relaciones sexuales, 47% refiere dificultad en su uso, concluyendo que Los estudiantes encuestados en el presente trabajo, manifiestan adecuado conocimiento de sexualidad y métodos anticonceptivos, con predisposición a usarlos, sin dejar de lado que este conocimiento debe plasmarse a futuro en una adecuada y mejor práctica de la sexualidad, con mejor conocimiento en métodos anticonceptivos.<sup>21</sup>

Forecelledo C, Suárez N y Tamargo T. en el año 2009 en Cuba, Investigaron caracterizar a los estudiantes y determinar los conocimientos, actitudes y uso del condon masculino en la prevención del VIH/ sida e identificar la percepción de riesgo de infección, fue un estudio observacional descriptivo de corte

transversal y en la totalidad de los estudiantes investigados, las vías de información que señalaron con mayor frecuencia fueron los programas de estudio de la carrera de medicina, la televisión, los folletos, los afiches y la radio, con 96.2 %, 94.3 %, 74.8 %, 73.6 % y 64.2 %, respectivamente. Las vías menos frecuentes fueron la pareja, los familiares, el trabajo en la comunidad y el servicio de línea ayuda. De los estudiantes encuestados 95,6 % manifestó que la información acerca del VIH/sida influyó sobre su conducta sexual. La identificación correcta de las infecciones de transmisión sexual la hicieron 42.1% y 57.9%, reconocieron incorrectamente las ITS. Ningún estudiante seleccionó de forma exclusiva la tuberculosis o la lepra como enfermedad de transmisión sexual. Los encuestados, a pesar de tener información sobre el VIH/sida por su formación profesional y afirmar que la misma ha tenido influencia en su conducta, tienen dificultades en la identificación de las ITS y sus vías de transmisión, lo que unido a su juventud, etapa de intensa actividad sexual y a la escasa protección en sus relaciones íntimas, los convierte en un grupo vulnerable .Además reconocen correctamente las formas en que se usa el condón y existen evidencias de buena aceptación del mismo por las parejas, obteniendo la siguiente conclusión manifestando percepción baja acerca del riesgo de contraer VIH/sida y dificultades e identificar correctamente los criterios para su reducción.<sup>22</sup>

En el año de 2009 en Perú se determinó la relación entre el nivel de conocimiento y comportamiento sexual en estudiantes del 1er. Nivel de las 13 facultades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad

de Iquitos durante el periodo 2009 con un estudio descriptivo correlacional. De una muestra de 286 estudiantes, el 52.4 % del sexo masculino y, 47.6 % del sexo femenino, el 62.6% evidencian adecuados conocimientos sobre VIH/SIDA y. 37.4% inadecuado conocimiento, el 61.8% de mujeres y el 76% de varones refieren tener conducta sexual de bajo riesgo, concluyendo que existe relación entre el mayor conocimiento sobre VIH y, menor comportamiento de riesgo sexual.<sup>23</sup>

Lameiras M, Faílde J, Bimbela J y Alfaro N. en el año 2008 en España. Evaluaron la frecuencia de uso de preservativo en las relaciones sexuales coito-vaginales de jóvenes españoles con edades entre 14 y 24 años, e identificar las variables relacionadas con los factores que predisponen, facilitan y refuerzan su utilización, fue un muestreo transversal analítico descriptivo, del total de 2.171 jóvenes que tomaron parte en el estudio, el 50,4 % informaron que habían mantenido relaciones sexuales coito vaginales en los últimos seis meses. De éstos, el 17,3% indicaron haberlas practicado una sola vez, mientras que el 82,7% informó haberlas practicado más de una vez, además un 90,5% indico haber utilizado siempre el preservativo masculino, mientras que para aquellos que tuvieron más de una relación el porcentaje es de 51,7%, en conclusión, los resultados de este estudio confirman la utilidad del modelo precede para efectuar el diagnóstico de la conducta sexual; sin embargo, se deben señalar algunas limitaciones del estudio. Por otro lado, no se han incorporado los análisis relativos a la relación entre uso del preservativo masculino y otros métodos anticonceptivos, tales como la píldora, para

analizar en qué medida pueden estar condicionado su uso. Estos aspectos deberían ser abordados en posteriores investigaciones. <sup>24</sup>

García P, Cotrina A, Carcamo C. en el año 2008, en Perú, promoviendo estilos de vida saludable en adolescentes y jóvenes en los temas de ITS/VIH/SIDA, financiado por el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Con Estudio Analítico de Corte Transversal en el que Un 21.2% (276) de las mujeres y 41.1% (455) de los varones adolescentes de 15 a 19 años reportaron haber tenido alguna vez relaciones sexuales. En Lima el 65.5% de varones y el 60% de mujeres, en Huancayo el 74.9% de varones y el 55.4% de mujeres y en Iquitos el 62.6% de varones y el 64.85 de mujeres, no usaron condones en la primera relación sexual, concluyendo que Alta proporción de adolescentes ha escuchado acerca del VIH, SIDA e ITS, siendo la proporción mayor en adolescentes mayores, una alta proporción reconoce el uso del condón como una forma de protección frente al VIH/SIDA, una menor proporción reconoce el no tener relaciones sexuales como una forma de prevención. <sup>25</sup>

Chirinos J, Bardales O y Segura M, en el año 2006 investigaron describir las relaciones coitales y la percepción de riesgo de adquirir ETS/SDIA en adultos jóvenes varones de Lima, con un estudio cualitativo observacional directa, cuyos resultados fueron que se puede evitar el embarazo utilizando el preservativo 95%, píldoras 79%, inyectables 57% y dispositivo intrauterino 53%. Para evitar el SIDA el 74% señala que usaría el condón, tendría una

pareja estable, sería fiel 65%; muy pocos señalan la abstinencia espontáneamente, pero lo reconocen cuando se le menciona. El 91.2% de los entrevistados ha tenido relaciones sexuales. Y con las conclusiones fueron que finalmente los varones reconocen al condón como protección más para el embarazo que para las ETS; pero el uso consistente y correcto son bajos, por lo que deberíamos trabajar más en la doble protección del preservativo. El dialogo con su pareja acerca de protegerse se incrementa entre la primera y la última relación sexual, lo que nos lleva a postular que se debe incidir más en las habilidades de comunicación y eliminar los mitos y creencias que existen entre varones y mujeres, además existe un alto riesgo de adquirir ETS/SIDA al protegerse solo con parejas desconocidas por lo cual se debe estudiar los comportamientos de riesgo más allegados y la vulnerabilidad de los jóvenes.<sup>26</sup>

Soto V en el año 2006 en Perú Precisar los factores asociados al no uso del condón en adolescentes y jóvenes en el distrito de Chiclayo y describir algunas características de su conducta sexual. Mediante un método Transversal, mediante muestreo polietápico con resultados de que la conducta sexual presenta diferencia en cuanto a la primera relación coital, siendo más precoces los varones. El uso adecuado del condón en los últimos seis meses fue mínimo en ambos sexos; la proporción de mujeres que refirieron que nunca lo habían usado fue muy alta. Concluyendo que el análisis multivariado mostró que los factores asociados al no uso de condón en varones fueron la falta de disponibilidad, disminución del placer y relación amorosa. En las mujeres,

pérdida de romanticismo, interferencia con la relación sexual y uso de otro método anticonceptivo.<sup>27</sup>

## 2.2. Base Teórica

### ➤ **Adolescencia:**

La adolescencia es la etapa entre la niñez y la adultez en el cual el individuo adquiere la madurez reproductiva, transitan los patrones biológicos, psicológicos y sociales. No es solamente un periodo de adaptación sino también una fase de grandes determinaciones estableciendo de esa manera una independencia socioeconómica y psicológica. Este periodo es comprendido entre los 10 y 19 años.

Además la adolescencia se divide en dos etapas:

#### ○ **Adolescencia temprana:**

Etapa comprendida entre 10 y 14 años

Características:

- Cambios corporales y relación infantil con los padres
- Discusión con los padres por los cambios psicológicos
- Reestructuración del esquema corporal
- Cambios sexuales
- Incremento de capacidad de abstracción y reflexión

- Afirmación a través de oposición
  - Relaciones grupales con el mismo sexo
  - Ansiedad transicional de las identificaciones a las identidades
  - cambios de animo
- **Adolescencia tardía:**
- Comprende entre los 15 y 19 años
- Ansiedad frente a decisiones que proyecta en el futuro
  - Conflicto con los padres por toma de decisiones
  - Autoridad confusa
  - Paulatina reestructuración de las relaciones familiares
  - Desarrollo de instrumentos para la adultez
  - Independencia
  - Exploración de opciones sociales y proyectos
  - Avances y conflictos en la elaboración de la identidad
  - Inicio de relación de pareja con diferenciación e intimidad
  - Capacidad de autocuidado y cuidado mutuo **1, 28,29 y 30.**

➤ **Condón masculino**

El condón masculino es una delicada funda de latex que se adapta a la forma del pene para cubrirlo cuando este en erección durante las relaciones sexuales, evita el contacto del espermatozoides con las mucosas que

revisten los genitales de la pareja sexual, para prevenir los embarazos no deseados, ITS y la transmisión del VIH-SIDA.

### **Eficacia del condón masculino**

La eficacia depende del usuario, el riesgo de un embarazo no deseado y contraer una ITS aumenta cuando no se usan en cada acto sexual. En la protección contra embarazos cuando estos se usan correctamente hay alrededor de 2 embarazos cada 100 mujeres y en la protección contra el VIH e ITS cuando se usan correcta y sistemáticamente los condones evitan entre 80% y el 95% de la transmisión del VIH.

### **Características del condón masculino**

- .Es un método eficaz si se usa correctamente.
- Pocos efectos negativos (alergia al látex o lubricante).
- De fácil obtención y bajo costo.
- No requiere examen ni prescripción médica.
- Fomenta la responsabilidad del varón en la anticoncepción.
- Su uso correcto reduce la transmisión de las ITS, VIH – SIDA y HTVL1 (virus linfotóxicas de células T con el ser humano).
- Depende del usuario requiere una motivación constante.
- Está relacionado con el coito.

- Puede mejorar su relación sexual cuando su colocación es parte del juego sexual.

### **Doble protección del condón masculino**

Consiste en utilizar un método que evite simultáneamente embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual incluido el VIH, al tener acceso a la doble protección forma parte de los derechos sexuales y reproductivos con las personas, pues se relaciona directamente con el derecho a decidir libre y responsablemente sobre todos los aspectos de su sexualidad y su vida reproductiva.

### **Mecanismo de acción**

Impide que los espermatozoides tengan acceso al tracto reproductor femenino.

### **Tasa de falla**

- Falla teórica o uso perfecto: 5 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso.
- Falla del uso o uso típico: 21 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso.

### **Uso correcto del condón masculino**

- Los preservativos deben guardarse en un lugar fresco y seco, evitando la exposición prolongada al calor o al sol.
- Verificar que en el envoltorio figure la fecha de caducidad y que no tenga ningún daño.
- No dañar el preservativo al abrir el envoltorio.
- Utilice un condón nuevo para cada acto sexual.
- Antes de cualquier contacto físico, coloque el condón en la punta del pene en erección con el lado enrollado hacia afuera.
- Desenrolle el condón bien hasta la raíz del pene en erección.
- Apriete con los dedos el depósito para evitar que quede aire en el interior y se rompa durante la relación.
- Inmediatamente después de la eyaculación, sostenga el borde del condón en su lugar y retire el pene mientras aun este erecto.
- Quite el condón cuando el pene este aun erecto y tirelo a la basura no al suelo ni al inodoro.

### **Indicación para el uso del condón masculino.**

Los condones masculinos pueden ser usados:

- Por todas las personas sexualmente activas, independientemente de la edad, estado civil, orientación sexual o general, que quieran protegerse de las ITS y el VIH.

- Para las parejas que desean evitar los métodos anticonceptivos que presentan efectos sistémicos, es decir los métodos que afectan al cuerpo como un todo.
- Para evitar tener que recurrir a la anticoncepción de emergencia.
- Para una protección adicional al iniciar otros métodos anticonceptivos que puede llevar un tiempo antes de brindar una reflexión completa.
- Para las parejas de las mujeres que tienen contraindicaciones para el uso de otros métodos anticonceptivos.
- Como método de doble protección.

### **Puntos clave para los usuarios**

- Requiere la cooperación tanto del hombre como de la mujer, hablar sobre el uso de condones antes del sexo puede mejorar las probabilidades de que los usen.
- En algunos hombres puede amortiguar la sensación sexual, hablarlo con la pareja ayuda a veces a vencer esta objeción.

### **Contraindicaciones**

- Alergia o hipersensibilidad al látex.
- Alergia o hipersensibilidad al lubricante.
- Personas con disfunciones sexuales.

### **Posibles efectos de su tratamiento**

Irritación del pene o vagina/alergia. El manejo consistirá en:

1. Si es una molestia que genera incomodidad, recomendar cambio de método anticonceptivo.
2. De ser necesario recomendar baños de asiento y uso de alguna crema tópica con efecto antipruriginoso y antiinflamatorio.<sup>31,32,33y34</sup>

## **INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL**

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan siendo un problema de salud pública de gran importancia en la mayoría de los países del mundo. Se considera que la incidencia de las ITS agudas es alta en muchos países. Las fallas en el diagnóstico y el tratamiento de las ITS en estadios tempranos pueden ocasionar graves complicaciones y secuelas, entre las que se incluyen la infertilidad, la pérdida fetal, el embarazo ectópico, el cáncer anogenital y la muerte prematura, así como infecciones en recién nacidos y lactantes.

Con la aparición del VIH y del SIDA, el control de las ITS comenzó a atraer más atención. Existe una fuerte correlación entre la diseminación de las ITS convencionales y la transmisión del VIH y se ha demostrado que tanto las ITS ulcerosas como las no ulcerosas aumentan el riesgo de transmisión sexual del VIH. 31

Las ITS son conjunto de afecciones clínicas infecto contagiosas que se transmiten de una persona afectada a otra que se encuentre sana, por contacto sexual, especialmente si no se utiliza preservativo.

## **SINDROMES CAUSADOS POR LA ITS**

Aunque hay muchos patógenos diferentes causantes de ITS, algunas de estas presentan signos (las manifestaciones objetivas que el paciente o el profesional sanitario observan en la exploración) y síntomas (las manifestaciones subjetivas que siente el paciente, como el dolor o la irritación) similares o coincidentes. Algunos de estos signos y síntomas son fácilmente reconocibles y sistemáticos, constituyendo lo que se denomina un síndrome, que señala la presencia de uno o varios patógenos.

Los principales síndromes de las ITS son:

- Úlceras genital (sífilis, chancro, herpes genital)
- Descarga uretral (gonorrea en el varón)
- Flujo vaginal (tricomoniasis, candidiasis, clamidiasis, gonorrea)

- Bubón inguinal (tumoración en la zona inguinal)
- Dolor abdominal bajo

## **PREVENCION**

### **MANERAS DE EVITAR EL CONTAGIO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL**

Evitar las prácticas de riesgo y teniendo un comportamiento sexual seguro, protegido y responsable. Actividades o situaciones en las que existe la posibilidad de que se intercambien o compartan: Fluidos (líquidos) potencialmente infectantes como: sangre, semen, secreciones vaginales, líquido pre-eyaculatorio, líquido amniótico o en el que se encuentra feto, leche materna, saliva, entre otros. Se tenga contacto directo con lesiones como úlceras, chancro u otros.

### **PRÁCTICA SEXUAL SEGURA**

Aquella en la cual no existe penetración pene-vagina o ano, ni contacto de boca con genitales por lo que no hay traspaso de secreciones sexuales ni de sangre.

## **PRACTICA SEXUAL PROTEGIDA**

En la que se utiliza correctamente una barrera mecánica como e condón de latex (masculino) para evitar el intercambio de secreciones o sangre.

## **MEDIDAS PREVENTIVAS MÁS IMPORTANTES PARA EVITAR CONTRAER EL VIH/SIDA O ALGUNA ITS**

- Las acciones preventivas son esencialmente las mismas para las ITS que para el VIH/SIDA puesto que ambas se transmiten fundamentalmente a través de las relaciones sexuales, de tal manera que pueda mencionarse las siguientes:
- Tener información general sobre estas enfermedades y sus consecuencias.
- Estar en conocimiento sobre las formas de contagio para evitar ponerlas en práctica.
- No teniendo relaciones sexuales (abstinencia sexual).
- Si se tienen relaciones sexuales, tenerlas con una persona a quien se conozca bien, que no esté infectada y con quien se practique la fidelidad mutua.
- Si se tienen relaciones sexuales, utilizar una barrera que impida el intercambio de fluidos como el condón masculino de latex y el femenino de poliuretano (sexo protegido).

- Recurrir al médico lo antes posible en caso de sospecha de padecer alguna de estas enfermedades **32 y 33**

- **RIESGO SEXUAL:**

Son situaciones nocivas para la persona como tener relaciones sexuales sin condón o habiendo consumido licor que desencadena los embarazos no deseados, las ITS y el VIH-SIDA.

- Diariamente observamos a nivel nacional, latinoamericano y en los países del primer mundo casos de VIH-SIDA por no usar el condón masculino ya que es una barrera altamente efectiva contra este Síndrome.
- Los condones no ofrecen una protección completa contra el Virus del Papiloma Humano y el virus del Herpes Simple ya que su uso solo disminuye el riesgo de adquirir esta infección. Además el no usar condones ha probado ser uno de los factores de riesgo más significativos para condiciones pres cancerosas relacionados con el Virus del Papiloma Humano. **35 y 36**

### 2.3. Hipótesis

El comportamiento del uso del condón influye en los embarazos no deseados, y en el riesgo sexual.

## 2.4. Variables

### OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Variable	Tipo de Variable	Dimensión	Definición Operacional	Escala	Valor
Comportamiento sobre el uso del condón masculino.	Cualitativa	Frecuencia del uso del condón masculino	Es la repetición del uso del condón masculino en las relaciones sexuales.	Nominal	F.1: -Existe frecuencia -No existe frecuencia
		Conocimiento acerca del uso	Es un conjunto de información		C.1: - conoce

		del condón masculino	almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje sobre el uso del condón masculino.		- no conoce
		Prevención de embarazos no deseados	Es la toma de medidas precautorias para evitar los embarazos no deseados.		E1: -Previene -No previene
		Riesgo sexual de las ITS	<b>-ITS:</b> Las infecciones de transmisión sexual son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosa s que se transmiten de persona a persona		R: - Existe Riesgo - No existe Riesgo

			<p>por medio del contacto sexual que se produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales.</p> <p><b>-Sífilis:</b> ITS producida por una bacteria que se transmite por vía sexual o de la madre gestante al feto y produce lesiones cutáneas ulcerosas en los órganos sexuales.</p> <p><b>-Chancro:</b> Ulceración con tendencia a extenderse y</p>	
--	--	--	---	--

			<p>destruir los tejidos vecinos; es de origen venéreo o sifilítico.</p> <p><b>-Gonorrea:</b> I.T.S que se caracteriza por la inflamación de las vías urinarias y los genitales y que produce un flujo excesivo de moco genital.</p> <p>- <b>VPH:</b> Virus del Papiloma Humano infectan el área genital general.</p> <p><b>-Herpes:</b> Es una ITS de tipo vírico, que se caracteriza</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>por la aparición de lesiones cutáneas formadas por pequeñas vesículas agrupadas en racimo y rodeadas de un aro rojo.</p> <p><b>-VIH:</b> El virus de la inmunodeficiencia humana es un <a href="#">lentivirus</a> causante del SIDA.</p> <p><b>-Sida:</b> El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es el conjunto de enfermedades de muy diverso tipo que resultan de la infección por el <a href="#">(VIH)</a>.</p>		
--	--	--	--	--	--

Adolescentes	Cualitativa	Edad	<p>Época de la vida en la cual tiene lugar el empuje de crecimiento puberal y el desarrollo de las características sexuales, así como la adquisición de nuevas habilidades sociales, cognitivas y emocionales.</p> <p>Según la OMS la adolescencia es el período comprendido entre los 10 y 19 años.</p>	Ordinal	E: 1
--------------	-------------	------	--	---------	------

## **CAPITULO III: DISEÑO METODOLOGICO**

### **3.1. Tipo y método de Investigación**

El siguiente estudio es observacional, comparativo, retrospectivo y transversal; observacional ya que solo se realizará la descripción de la variable en este periodo de tiempo y no vamos a influir en los factores; comparativo porque se basa en la revisión de estudios anteriores para poder compararlos y dar posibles medidas de solución de problemas de investigación, retrospectivo porque vamos a utilizar de referencia los estudios anteriores; transversal, porque el estudio se va a realizar en un determinado tiempo.

### **3.2 Aspectos éticos.**

El presente trabajo está exento de la revisión del comité de ética ya que no se trabaja directamente con humanos.

## **CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION**

### **4.1. Resultados.**

**A nivel Nacional.**

<b>AUTOR</b>	<b>AÑO</b>	<b>OBJETIVOS</b>	<b>MÉTODOS</b>	<b>RESULTADOS</b>
INEI	2015	Evaluar la tendencia de la fecundidad adolescente de los últimos años y describir los diferenciales socioeconómicos para contribuir a reforzar las acciones específicas que se lleven a cabo en el país dirigidas a este grupo poblacional de mayor vulnerabilidad.	Encuesta Demográfica	La fecundidad de las adolescentes es del 54% ya son madres y el 17,6% están embarazadas por primera vez.
Breña P y	2014 HYO	Evaluar el nivel de conocimiento sobre el uso del	Estudio Descriptivo	Del total de estudiantes 40% tienen conocimiento regular y el uso del condón 25,5%, le

Pariona J.		condón masculino como prevención del comportamiento del riesgo sexual en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria	Simple Transversal.	sigue el conocimiento bueno de 39,1% y el uso del condón 30%.  Del grupo de adolescentes de 16 años el 40% están sexualmente activos, el 18,2% tienen riesgo bajo por que usan condón en todas sus relaciones sexuales.
INEI	2013	Determinar la Salud Materna Infantil	Encuesta Demográfica	El conocimiento sobre las ITS en adolescentes es de 46,8%entre el año 2009 y 2013. La gonorrea fue más la enfermedad más conocida por los adolescentes (33,1%), seguida de la sífilis en un 29,8%, el herpes 15,0%, el chancro (13,3%), y verrugas genitales (5,2%). Otras ITS 7,7%.

Navarro M y López A	2012 Tarapoto	Determinar nivel de conocimiento y actitudes sexuales en adolescentes.	Estudio Descriptivo Simple no experimental de corte Transversal con recolección Prospectiva de datos.	Del total un 54,4% de adolescentes a iniciado relaciones sexuales; el 54,7% inicio sus relaciones sexuales entre los 12 y 15 años, sobre conocimientos de anatomía y fisiología sexual el 43,3% tienen nivel de conocimiento alto y el 41,8% tiene conocimiento medio; sobre conocimiento de las ITS VIH-SIDA el 50,6% tiene conocimiento alto, y sobre los métodos anticonceptivos en 56% tiene conocimiento alto.
Diaz G	2012 Lima	Determinar comportamientos sexuales en un grupo de hombres de alto riesgo que tienen sexo con hombres	Muestra aplicativa no probabilística.	La mayoría de la muestra estudiada no usa condón en sexo oral y el 92,1% de la muestra uso alcohol durante las relaciones sexuales, además que el 6,3% de la muestra de estudio resultaron positivos a la prueba de VIH,

				mientras que el 93,3% se mantuvieron con VIH negativo.
Vásquez p, Rojas M, Torres R, Salazar N, Alvarado H, Díaz C y col.	2009 Iquitos	Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y comportamiento sexual en estudiantes del 1er. Nivel de las 13 facultades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad de Iquitos durante el periodo 2009.	Estudio descriptivo correlacional.	De una muestra de 286 estudiantes, el 52.4 % del sexo masculino y, 47.6 % del sexo femenino, el 62.6% evidencian adecuados conocimientos sobre VIH/SIDA y. 37.4% inadecuado conocimiento, el 61.8% de mujeres y el 76% de varones refieren tener conducta sexual de bajo riesgo.
Jeronimo C, Alvarez J,	2009 Peru UNMS	Evaluar las características del conocimiento, actitud y práctica	Estudios Descriptivo de Corte transversal	De 247 estudiantes, 50,5% fueron de sexo femenino y 49,5% fueron de sexo masculino, El 47,6% de los

<p>Carbonel W y Neira J</p>		<p>sobre sexualidad y métodos anticonceptivos en estudiantes del cuarto y quinto año de educación secundaria del cercado de Ica.</p>		<p>estudiantes señaló que la persona con quien habla de sexo eran los padres. 34,6% señaló que la fuente de información primaria sobre sexualidad era la madre y el profesor 28,6%. El 72,2% perciben que su conocimiento sobre sexualidad es regular y 90,0% que conoce los métodos anticonceptivos. El 93,5% está predispuesto a usarlos en una relación sexual, siendo el condón el método que más se usaría (62,4%). El 61% de los estudiantes manifestaron tener enamorado(a); 27% refirieron haber tenido ya relaciones coitales (132). De ellos un 76,5% usan condón en sus relaciones sexuales,</p>
-------------------------------------	--	--	--	---

				47% refiere dificultad en su uso.
García P, Cotrina A, Carcamo C	2008	Promover estilos de vida saludable en adolescentes y jóvenes en los temas de ITS/VIH/SIDA, financiado por el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.	Estudio Analítico de Corte Transversal	Un 21.2% (276) de las mujeres y 41.1% (455) de los varones adolescentes de 15 a 19 años reportaron haber tenido alguna vez relaciones sexuales. En Lima el 65.5% de varones y el 60% de mujeres, en Huancayo el 74.9% de varones y el 55.4% de mujeres y en Iquitos el 62.6% de varones y el 64.85 de mujeres, no usaron condones en la primera relación sexual
Soto V.	2006 UNSM	Precisar los factores asociados al no uso del condón en adolescentes y jóvenes en el distrito de	Transversal, mediante muestreo polietápico	Se encuestó un total de 393 personas, 197 varones y 196 mujeres. El uso del condón no fue considerado, en la primera relación sexual, en 56% del

		Chiclayo y describir algunas características de su conducta sexual.		total de encuestados; fue mayor en las mujeres (70,4%) que en los varones (42%).
Chirinos J, Bardales O y Segura M.	2006	Describir las relaciones coitales y la percepción de riesgo de adquirir ETS/ SIDA en adultos jóvenes varones de Lima.	Estudios Cualitativo observacional directa	Se puede evitar el embarazo utilizando el preservativo en un 95%, píldoras 79%, inyectables 77% y DIU 53%. Para evitar el SIDA el 74% señala que usaría el condón, tendría una pareja estable, en un 65% y el 91,2% de los entrevistados a tenido relaciones sexuales.

### A nivel Internacional.

AUTOR	AÑO	OBJETIVOS	METODO	RESULTADOS
Uribe I, Aguilar J, Zacarías X y Aguilar A.	2015 MEXI CO	Identificar los factores que inciden en el uso del	No probabilís tica por	De 523 estudiantes, 256 son varones, el 68.8% usó condón masculino en su primera relación sexual y el 31.2% no

		condón en las relaciones sexuales en una muestra de adolescentes	conveniencia	usó condón masculino en su primera relación sexual y el 2.1% no contesto. Concluyendo el uso del condón en las relaciones sexuales de adolescentes esta vinculado al desarrollo de habilidades asertivas así como percepciones positivas y aceptación del uso del condón masculino en las relaciones sexuales.
Garcia R, Cortés A, Vila L, Hernandez M y Mesquia A.	2014 MEXI CO	Identificar los comportamientos sexuales y el uso del preservativo como medio de protección hacia el VIH/SIDA	Descriptivo	De un total de 100 estudiantes el 61% tiene vida sexual activa, de estos el 30% nunca usó preservativo masculino y el 49% ocasionalmente lo usó, las principales causas argumentadas para no usarlo fue que les resultaba incómodo y que no le gustaba a su pareja.

Uribe I, Amador G, Zacarias X y Villareal L	2012 MEXI CO	Determinar la percepción sobre el uso del condón y la actividad sexual de riesgo en jóvenes universitarios	Estudio cuantitativo transversal de tipo descriptivo y correlacional con un diseño no experimental	De 263 estudiantes de nivel superior, el 32% de los varones y el 30% de mujeres reportaron no haber usado condón masculino en su primera relación sexual
Valencia C y Canaval G	2012 COL OMB IA	Identificar la frecuencia del uso habitual del condón y los factores que predicen, facilitan y refuerzan su uso en	Analítico de corte transversal con análisis multivariado	De 397 estudiantes, 33% usan habitualmente el condón, los factores predisponentes fueron el tener la intención y la alta autoeficacia en su uso con la pareja ocasional. El condon intensifica el placer al sentirse protegidos y que entre los amigos el condon sea aceptado.

**Países del primer mundo**

		jóvenes universitarios		
Pereira D y Ferreira E.	2012 Brazil	Identificar el uso del preservativo entre adolescentes de sexo masculino en el inicio de su vida sexual.	Descriptivo – Exploratorio	El 93.4% Conocen el condon masculino y 69.8% consideran su uso importante.  El 40.4% usaron el condon en su primera relación sexual y 31% en las relaciones siguientes.
Vargas E, Morales E, Galicia L, Ortiz R y Villareal E.	2012 Mexico	Describir la definición de sexualidad por género en población adolescente	Transversal Analítico.	De 296 adolescentes el 54.5% de las mujeres definen la sexualidad como la forma que tienen las personas para relacionarse entre si, 41.8% como relaciones sexuales; 40.8% de los hombres como relaciones sexuales y 39.2% como diferencia de genero.
Garcia N, Mendez G,	2011	Describir las actitudes	Diseño Descriptivo	De un total de 258 estudiantes que reconocieron tener

Gutierrez A, Pèrez J y Aranda R.	CUB A	hacia el uso del condón masculino para la prevención del VIH – SIDA en estudiantes de Medicina	o con un corte transversal.	relaciones sexuales con penetración, el 85.6% comenzó estaspr4acticas entre los 15 y 19 años y el 14,4% antes de los 15 años de edad. De ellos solo 29.1%respondio que siempre había hecho uso sistemático del condón y 43.4% no se protegió nunca.
Caballero M, Camargo F y Zurany B	2011 Colo mbia	Determinar la prevalencia de prácticas inadecuadas de uso del condón y sus factores asociados en estudiantes universitarios.	Estudio de Corte Transver sal	Del total de 2328 estudiantes, 23% recibió información de VIH por parte de la universidad, utiliza siempre el condón durante las prácticas sexuales 39%, proporcionar siempre yo el condón en la relación sexual 40%.
Forecelledo C, Suarez	2009 CUB A	Determinar conocimiento s, actitudes y	Observac ional, Descriptiv	El uso del condón en la primera relación sexual con penetración fue de 21.38%;

N y Tamargo T.		uso del condón masculino en la prevención del VIH – SIDA. E identificar la percepción de riesgo de infección.	o y Transver sal.	con frecuencia usan el 32.3%, eventualmente 26.6% y nunca usaron el 4%.  El 61.1% consideraron de forma correcta que el momento de ponerse el condón es antes de la penetración y el 38.9% no saben en qué momento de ben ponerse el condón.  Las razones por las cuales no se utiliza el condón fueron 47.9% no saben, 19.4% no disponibilidad 18.1% otros métodos y 13% no les gusta usarlo
-------------------	--	--	-------------------------	--

AUTOR	AÑO	OBJETIVO	METODO	RESULTADO
Meza M, Barella J, Cobeña M.	2016 España	Identificar comportamientos sexuales en adolescentes	Estudio descriptivo transversal mediante una encuesta	En una muestra de 84 alumnos el 61,9% era mujer, y el 38.1% fueron

			estructurada anónima.	varones, El 30,1% de los varones.  Ambos sexos utilizan el preservativo en el 71,4% de las ocasiones.
Teba I, Paz M y Ramiro M	2014 ESPAÑA	Evaluar y analizar la relación entre la satisfacción sexual, las actitudes hacia el uso del preservativo y el uso del preservativo en adolescentes	Estudio descriptivo con muestra probabilística de tipo transversal	De un total de 1504 adolescentes, 48.40% varones y 51.60% mujeres; el 33.60% de varones y el 35.36% de mujeres muestra una actitud positiva hacia el uso del preservativo, el 5.39% de varones y el 4.97% de mujeres muestra satisfacción sexual personal.

				El 6.12% de varones y el 5.54% de mujeres muestra satisfacción sexual de la pareja, el 5.78% de varones y el 6.31% de mujeres muestra satisfacción sexual sobre la sintonía de pareja.
MINSA y INDEC	2014 argentina	Mejorar las condiciones de acceso de la población a los métodos anticonceptivos disponibles en forma gratuita de los centros de atención primaria de salud en todo el país.	Tipo probalístico	El 94% de las mujeres utilizan pastillas anticonceptivas en primer término, seguido por el preservativo masculino un 87% y un 62% al DIU, en los varones el método más nombrado es el preservativo con un

				95%, luego las pastillas anticonceptivas con un 82% y 37% mencionaron el DIU
UNICEF	2012 argentina	Identificar y analizar los conocimientos, actitudes y prácticas vinculadas a la salud sexual reproductiva, VIH-ITS	Estudio cuantitativo descriptivo temporal	Con una muestra de 1100 casos, el 97% menciona conocer al menos un método anticonceptivo para evitar embarazos, el 375 pudo indicar al menos 2, el método anticonceptivo mas mencionado fue el preservativo con 96%, pastillas anticonceptivas con un 66% y el DIU con 22%.
Paz M, Herencia	2009 España	Determinar las versiones fuerte y débil del	Ex-post-facto.	El 31.2 % de parejas estables indicaron que nunca utilizaron

A y Uribe A		modelo de información, motivación – habilidades conductuales en la predicción del uso del preservativo.	Retrospectivo factorial.	el preservativo; estos porcentajes fueron de 29.8% para la categoría que avances utiliza el preservativo y 39% para el uso consistente del preservativo, indicando que se hace un mayor uso de el con las parejas ocasionales.
Lameiras M, Failde J, Bindela J Y Alfaro N.	2008 España	Evaluar la frecuencia del uso del preservativo en las relaciones sexuales coito – vaginales de jóvenes españoles con	Transveral Analítico Descriptivo	Del total de 271 jóvenes que tomaron parte del estudio, 1.095% habían mantenido relaciones sexuales coito vaginales en los últimos 6 meses, de estos 17.3% indicaron haberles

		edades entre 14 y 24 años		practicado solo una vez y el 82.7% más de una vez. Del grupo en general 24.6% nunca uso preservativo.
--	--	---------------------------	--	--

#### 4.2. Discusión.

##### **A nivel nacional:**

Breña P y Pariona J. en su investigación de la muestra estudiada, cuyo resultado fue del 40% de encuestados que tienen conocimiento sobre el uso del condón masculino arrojando así resultados parecidos al de la investigación hecha por Navarro M y López A, en la cual el 56% tiene alto conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, mientras que en la investigación de Jeronimo C, Alvarez J, Carbonel W y Neira J. el 72,2% perciben que su conocimiento sobre sexualidad es regular y 90,0% que tienen conocimiento sobre los métodos anticonceptivos. Lo que nos dice que el conocimiento acerca del uso del condón masculino es un tema que no se desconoce en el Perú.

Garcia P, Cotrina A y Carcamo C en su investigación el 21.2% de las mujeres y 41.1% de los varones reportaron haber tenido alguna vez

relaciones sexuales y no usaron el condón masculino en la primera relación sexual, mientras que en la investigación realizada por Soto V. reportó que el uso del condón no fue considerado, en la primera relación sexual, en 56% del total de encuestados; fue mayor en las mujeres (70,4%) que en los varones (42%). Lo que nos indica que no existe una real conciencia acerca del uso del condón a pesar de que se conoce del mismo, por otro lado se observa que las mujeres son las que se descuidan mayormente el uso del mismo.

INEI, en su investigación sobre las ITS-VIH arrojó que un 46,8% tiene conocimiento sobre este, mientras que la enfermedad más conocida por los adolescentes fue la gonorrea con 33,1%, seguida de la sífilis con 29,8%, mientras en la investigación realizada por Chirinos J, Bardales O y Segura M. la muestra estudiada indicó que se puede evitar el embarazo utilizando el preservativo en un 95%, además para evitar el VIH-SIDA el 74%, y además en la investigación realizada por el INEI, para evaluar la tendencia de fecundidad adolescente muestra una tasa de fecundidad de 54% que ya son madres adolescentes y el 17,6% están embarazadas por primera vez. Lo que nos dice que los adolescentes en el Perú tienen poco conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual, incrementando así el riesgo sexual, pero a la vez estos si conocen que el condón masculino evita los embarazos no deseados.

Díaz G. en su investigación, la mayoría de la muestra estudiada no usa condón en sexo oral y el 92,1% de la muestra usó alcohol durante las

relaciones sexuales. Lo que nos indica que los adolescentes a pesar de tener conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, el riesgo sexual es elevado debido a no estar concientizados.

### **A nivel Internacional**

Uribe I, Aguilar J, Zacarías X y Aguilar A. en su investigación de la muestra estudiada el 68.8% usó condón masculino en su primera relación sexual y el 31.2% no usó condón masculino en su primera relación sexual, al igual que la investigación de Uribe I, Amador G, Zacarias X y Villareal L el 32% de los varones y el 30% de mujeres reportaron no haber usado condón masculino en su primera relación sexual, en la investigación de Pereira D y Ferreira E, el 40.4% usaron el condón en su primera relación sexual, en la investigación de Forecelledo C, Suarez N y Tamargo T, El 21.38% uso del condón en la primera relación sexual. Lo que nos dice que las tanto varones como mujeres usan el condón en su primera relación sexual.

Garcia R, Cortés A, Vila L, Hernandez M y Mesquia A en su estudio el 49% ocasionalmente uso el preservativo, en la investigación de Valencia C y Canaval G en su estudio el 33% usan habitualmente el condón, en la investigación de Pereira D y Ferreira E. el 31% usa condón en sus relaciones sexuales, en la investigación de Garcia N, Mendez G, Gutierrez A, Pèrez J y Aranda R el 29.1% respondió que siempre había hecho uso sistemático del condón, en la investigación de

Caballero M, Camargo F y Zurany B, el 39% utiliza siempre el condón durante las prácticas sexuales, en la investigación de Forecelledo C, Suarez N y Tamargo T, el 32.3%, usa condon con frecuencia, el 26.6% usan el condón eventualmente. Lo que nos dice que tanto varones como mujeres usan el condón en sus relaciones sexuales tanto habitualmente y con frecuencia.

Caballero M, Camargo F y Zurany B en su investigación nos dice que el 23% de estudiantes, utilizan siempre el condón durante las prácticas sexuales, ya que tienen conocimiento de que esto les protege del VIH.

### **Países del primer mundo**

Meza M, Barella J, Cobeña M. en la investigación que realizaron de una muestra de 84 alumnos, ambos sexos utilizan el preservativo en un 71,4%, mientras que en la investigación realizada por Teba I, Paz M y Ramiro M. la muestra estudiada tuvo una actitud positiva hacia el uso del preservativo, el 5,39% de varones y el 4,97% de mujeres muestra satisfacción sexual personal, además en los estudios realizados por el MINSA y INDEC las mujeres utilizan el preservativo en 87% y los varones utilizan el preservativo en 95% y en la investigación realizada por la UNICEF, el método anticonceptivo más mencionado fue el preservativo con 96%. Lo que nos indica que el grupo estudiado tienen adecuado conocimiento sobre el uso del condón masculino evitando así de gran manera obtener un riesgo sexual.

Paz M, Herencia A y Uribe A en su investigación el 31,2% de parejas estables indicaron que nunca utilizaron el preservativo y el 39% de parejas ocasionales indicaron que usan constantemente el preservativo, mientras en la investigación realizada por Lameiras M, Failde J, Bindela J y Alfaro N. del total de adolescentes el 24,6% menciona que nunca uso el preservativo. Lo que nos muestra que el riesgo de poder contraer una infección de transmisión sexual, además de un embarazo no deseado se incrementa.

## **CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

### **5.1. Conclusiones.**

Concluimos que a nivel nacional el 62% de los adolescentes conocen condón masculino, sin embargo el 87.15% no utilizo condón en su primera relación sexual, y también que el 46,8% de los adolescentes tiene conocimiento de las ITS, VIH-SIDA, siendo la sífilis la infección más conocida por los adolescentes, además que el 71.6% de los adolescentes ya son madres o están embarazadas por primera vez. Por lo que podemos concluir que aunque los adolescentes tengan amplio conocimiento acerca de los condones masculinos, no tienen una real conciencia acerca del uso del condón masculino, para evitar embarazos no deseados y contraer algún ITS, VIH-SIDA.

Concluimos que a nivel internacional el 50% de los adolescentes ha utilizado el condón masculino en su primera relación sexual y el 32,88% utiliza el condón masculino siempre, y que el 37,8% ocasionalmente utiliza el condón masculino, también que el 33% tiene conocimiento de los ITS, VIH-SIDA. Por lo que estos adolescentes tienen mayor riesgo sexual y de tener embarazos no deseados

Concluimos que a nivel de los países de primer mundo el 81.2% tiene relaciones sexuales con condón masculino, y el 27,9% nunca uso el condón masculino en sus relaciones sexuales, también que el 96% de los adolescentes tienen conocimiento acerca del uso del condón masculino. Por lo que estos adolescentes tienen menor riesgo sexual y de tener embarazos no deseados

## 5.2. Recomendaciones.

A los profesionales de la Salud tanto a se les recomienda brindar charlas educativas en los colegios y universidades y centros de trabajo, teniendo un realce en las consecuencias sobre los riesgos sexuales al que se exponen al no hacer uso del condón masculino tanto varones como mujeres.

Al estado se le recomienda Proporcionar material educativo a los adolescentes como videos, trípticos, en los cuales puedan apreciar las consecuencias de no usar el condón masculino.

Continuar con los programas preventivos promocionales en temas referidos a la sexualidad, riesgo sexual y embarazos no deseados.

Continuar con los consultorios para la atención diferenciada a los adolescentes con un profesional capacitado que brinde la confianza y confidencialidad a los adolescentes para que así puedan tener una sexualidad responsable y segura y esta pueda estar al alcance de los mismos.

Afianzar la escuela de padres como estrategia para propiciar la comunicación entre padres e hijos.

Fortalecer las campañas de prevención y promoción sobre ITS, VIH/SIDA y embarazo en adolescentes, como talleres didácticos sobre educación sexual en adolescentes.

## BIBLIOGRAFIA

1. MINSA. Prevención del embarazo en adolescentes. 2010.
2. MINSA, UNFRA. Provisión y uso de condones masculino y femenino para prevenir embarazos no planificados, ITS y VIH-SIDA. 2011:189.
3. Uribe J, Amador G, Zacarías X, y Villarreal L. Percepciones sobre el uso del condón y la sexualidad entre jóvenes. Rev Lat de CC SS, Niñez y Juv. 2012;Vol.10:481-94.
4. Mesa M, Barella J y Cobeña M, Comportamientos sexuales y uso de preservativos en adolescentes de nuestro entorno Mesa Gallardo MI, et al. 2016.
5. Uribe I, Aguilar J, Zacarias X y Aguilar A, Modelos Explicativos del Uso del Condón en las Relaciones Sexuales de Adolescentes. Acta de Inv. Psicol. 2015;Vol.5:1904–915.
6. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los adolescentes y su comportamiento reproductivo. Perú. INEI.2013. Pag21.
7. Teba I, Paz M y Ramiro M, Satisfacción sexual y actitudes hacia el uso del preservativo en adolescentes.Rev.Latino.Psicol. 2014;Vol.46:127-36.
8. García R, Cortés A, Vila L, Hernández M y Mesquia A. Comportamiento sexual y uso del preservativo en adolescentes y jóvenes de un área de salud. Rev Cubana Med Gen Integr. 2014;Vol.22

9. Breña P y Pariona J. conocimiento y uso del condón masculino como prevención del comportamiento de riesgo sexual en estudiantes de concepción.
10. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica de Salud Familiar – Endes. Perú. INEI.2013. Pag:317-45.
11. Uribe I, Amador G, Zacarías X y Villarreal L. Percepciones sobre el uso del condón y la sexualidad entre jóvenes. Rev. Latino de CC. SS, Niñez y Juv. 2012;Vol.10:481-94.
12. Valencia C y Canaval G. 2012. Factores que predisponen, facilitan y refuerzan el uso del preservativo en jóvenes universitarios de Cali, Colombia, Rev. Sal Públ. 2012;Vol.14:810-21.
13. Pereira D, Ferreira E. 2012. Uso do preservativo masculino por adolescentes no inicio da vida sexual. Adoles. Saude. Rio de Janeiro. 2012;Vol.9:37-44.
14. Vargas E, Morales E, Galicia L, Ortiz R y Villareal E. La sexualidad en adolescentes. Rev Enferm Inst Mex. 2012;Vol.20:149-56.
15. Navarro M y López A. Nivel de conocimiento y actitudes en adolescentes de la urbanización Las Palmeras – Distrito de Morales. Periodo Junio – setiembre 2012.
16. Díaz G. Comportamientos sexuales de un grupo de hombres de alto riesgo que tienen sexo con hombres en Lima – Perú. RevPsicolHered.2012;Vol7:10-20

17. UNICEF conocimientos, actitudes y prácticas en VIH y salud sexual y reproductiva (ssr) y uso de tecnologías de la información y la comunicación (tic) entre adolescentes de argentina, 2012
18. García N, Méndez G, Gutiérrez A, Pérez J y Aranda R. Actitudes hacia el uso del condón masculino para la prevención del VIH/ sida en estudiantes de Medicina. Rev.CienciasMedicas.Cuba.2011;Vol.15:38-49.
19. Caballero M, Camargo F y Zurany. Practicas inadecuadas del uso del condón y factores asociados en estudiantes universitarios
20. Paz M, Herencia A y Uribe A. Versiones fuerte y débil del modelo de información, motivación – habilidades conductuales en la predicción del uso del preservativo. Rev.Lat.Ps.España.2009;Vol.41:587-98.
21. Jeronimo C, Alvarez J, Carbonel W y Neira J. Sexualidad y métodos anticonceptivos en estudiantes de educación secundaria. Acta Med Per. 2009.26(3)
22. Forecelledo C, Suárez N y Tamargo T. Conocimientos, actitudes y uso del condón masculino en la prevención del VIH/sida en estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. Pinar del Rio,Cuba. HORIZONTE SANITARIO. 2009;Vol.8:7-24.
23. Vasquez P, Rojas M, Torres R, Salazar N, Alvarado H, Diaz C, y Col. Conocimiento en vih/sida y comportamiento sexual en estudiantes de la unap. Iquitos. Peru. 2009.
24. Lameiras M, Falde J, Bimbela J y Alfaro N. Uso del preservativo masculino en las relaciones con coito vaginal de jóvenes españoles

- entre catorce y veinticuatro años. Rev.Diversitas –Perspectivas en Psicología. 2008;Vol.4:401-15.
25. Garcia P, Cotrina A, Carcamo C. Adolescentes y sus madres frente al
26. Chirinos J, Bardales O y Segura M. Las relaciones coitales y la percepción de riesgo de adquirir ETS/SIDA en adultos jóvenes varones de Lima, Perú. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro.2006;Vol,22:79-85
27. Soto V. Factores asociados al no uso del condón. Estudio en adolescentes y adultos jóvenes de Chiclayo. An Fac Med Lima. 2006:152-59
28. Pineda S y Aliño M. Concepto de adolescencia.
29. Krauskopf D. Etapas del desarrollo psicosocial en la adolescencia. Rev.Jor Adol.Clin. Alemana.Valdivia. 2011.
30. Acosta J. Marketing Personal.2014.
31. Planificación Familiar. Condones masculinos.Cap.13:199-210.
32. Manual para la adquisición, suministro y distribución de Condones en Colombia.2013.Cap.1:23-29.
33. Salud Sexual. Guía de Métodos Anticonceptivos.España.Pag.10-2.
34. Provisión y Uso De Condones Masculino y Femeninos Para Prevenir Embarazos No Planificados ITS Y VIH-SIDA.MINSA.2011;Pag.85.
35. Bahamón L, Vianchá M y Tobos A. Prácticas y Conductas Sexuales de Riesgo en Jóvenes: Una Perspectiva de Género.Rev.Ps.Caribe.2014;Vol.31(2):327-53

36. Rodríguez G. Libro sobre Sexualidad, Anticoncepción y Aborto para Jóvenes. México. 2004.